


CASI CLINICI

Giulio Perugi

MARCO

24-anni, Disoccupato



- Diagnosi **schizofrenia (schizoaffettivo ?)**
- in comorbidity con **disturbo da panico/agorafobia, e SUD (cannabis)**
- Personalità premorbid:
 - ✓ **Temperamento sensibile/ciclotomico**
 - ✓ **ansia di separazione**
 - ✓ **Tratti di personalità cluster A and B**
 - ✓ **(credenze non convenzionali, bizzarre, ricerca di novità)**
- Familiarità psichiatrica: **disturbo bipolare, disturbo di panico**

Storia psichiatrica

PRIMO EPISODIO

- **Esordio all'età di 14 anni:** periodo di umore elevato, irritabilità e insonnia subtotale
- **Abuso di sostanze:** alcol, cannabis, stimolanti (cocaina e anfetamine), ketamina, LSD
- **Impatto scolastico:** interruzione della frequenza scolastica all'età di 14 anni
- **Impatto Sociale:** conflitti familiari e relazioni interpersonali limitate ai tossicodipendenti

ANNI SUCCESSIVI

Non ha ritrovato il suo precedente livello di funzionamento e benessere personale

Persistenza di **Abuso di sostanze**

Sbalzi d'umore subsindromici con **irritabilità e scoppi di rabbia**

Disoccupato

Disturbo ciclo sonno/veglia (DEPSD), apatia durante il giorno

UN ANNO PRIMA DELLA PRIMA OSSERVAZIONE

Involnizio di una relazione sentimentale

- **Aumento uso di cannabis**, interruzione di altre sostanze
- **Ansia, gelosia patologica e comportamenti di controllo**
- **Comportamenti auto-aggressivi** (schiacci, pugni, graffi contro se stesso)
- **Ritiro sociale**

Episodio attuale

- **Evento di vita stressante:** interruzione relazione sentimentale
- **Irrequietezza, insonnia totale parziale, attacchi di panico, allentamento dei nessi associativi (eccitamento psicotico)**
- **Deliri religiosi con esperienze mistiche**
- **Stalking e comportamenti persecutori** contro l'ex-fidanzata
- **Ospedalizzazione**

Opzioni terapeutiche


- Aloperidolo
- Quetiapina
- Risperidone
- Olanzapina
- Clozapine
- Aripiprazolo



Clicca qui per votare:

<https://pigeonhole.at/FARMACOTERAPIA/po/1389332>

MARIA



47 anni, assistente sanitaria

- Diagnosi di **schizofrenia**
- Comorbidità con: **Ipertensione arteriosa**
- Personalità Premorbosa:
 - ✓ **Ansia di separazione**
 - ✓ **tratti cluster C personalità (timidezza, bassa autostima)**
- Storia familiare: **attacco di cuore**

Storia psichiatrica

PRIMO EPISODIO : ETÀ 26

- **Psicosi post-partum** con irrequietezza, ansia, deliri depressivi
- La paziente si rifiutò di allattare suo figlio, perché pensava che il bambino sarebbe morto
- La paziente **tenta suicidio** ed è ricoverata in ospedale (terapia non specificata al momento della dimissione)

UN ANNO DOPO

Ricaduta con le stesse caratteristiche


- **Tentativo anticonservativo di flebotomia**
- È stata ricoverata in ospedale: **QUETIAPINE 400 mg/die alla dimissione**



NEGLI ANNI SUCCESSIVI

ha un funzionamento e un benessere sufficienti (inferiore a quello premorboso)

All'età di 45 anni

- **Evento di vita stressante:** morte della madre
- **Agitazione, ansia, deliri di persecuzione e di riferimento, allucinazioni uditive**
- Si rifiutava di mangiare (paura di essere avvelenata)
- È stata ricoverata in ospedale: **PALIPERIDONE fino a 9 mg/die** 
- **Al follow-up:** nessuna allucinazione e nessun grave sintomo positivo, ma appiattimento affettivo, ritiro emotivo, anedonia

UN ANNO DOPO

- Aumento di peso (8 kg)
- Il paziente (già affetto da ipertensione) ha sviluppato:
 - tolleranza al glucosio alterata**
 - ipercoesterolemia** (colesterolo totale 294 mg/dl; colesterolo LDL 133 mg/dl)
 - Ipertrigliceridemia** (tryglicerides 266 mg/dl)
- **Al fine di ridurre l'AE: Riduzione PALIPERIDONE a 3 mg/die**
- **Sospettosità, idee di riferimento, agitazione, ansia**
- È stata ricoverata in ospedale: **HALDOL 3 mg/die: ↑QTc > 500 msec**



Valutazione fisica

- Weight: 85 kg; height: 1,65 m
- PA 140/95; FC 90
- total cholesterol 294 mg/dl
- cholesterol LDL 133 mg/dl
- tryglicerides 266 mg/dl
- QTc: 505 msec

Valutazione psichiatrica

- sospettosità, idee di riferimenti
- sintomi misti (Irritabilità)
- alogia
- Ansia
- deficit di attenzione
- disabilità funzionale

Quale antipsicotico useresti per questo paziente?

- Aloperidolo
- Quetiapina
- Olanzapina
- Clozapine
- Aripiprazolo




Clicca qui per votare:

<https://pigeonhole.at/FARMACOTERAPIA/po/1389393>

IURI

49-anni, Lavoratore



- Diagnosi di **Disturbo delirante**
- Personalità Premorbosa :
 - ✓ **temperamento ipertimico**
 - ✓ **Tratti ossessivo-compulsivi**
 - ✓ **tratti di personalità del cluster A (bizzarrie, credenze non convenzionali, tratti paranoici)**
- **Family History: Disturbo bipolare**

Storia psichiatrica

PRIMO EPISODIO

- **Età 43:** periodo di umore elevato, irritabilità e convinzioni non convenzionali e gelosia delirante
- **Social impairments:** conflitti familiari

ANNI SUCCESSIVI

- Oscillazioni dell'umore
- Episodio depressivo: stanchezza, clinofilia, bassi livelli di volo
- Episodio espansivo: irritabilità, deliri di gelosia

UN MESE PRIMA DELLA PRIMA OSSERVAZIONE

- Aumento dell'eccitazione, agitazione, irritabilità
- Episodio di discontrollo sul lavoro
- Deliri di riferimento e gelosia

Episodio attuale

- **Sintomi psicotici e misti**
- **Deliri di gelosia, irritabilità, ansia, sospettosità, aumento della latenza di risposta**
- **Separazione dalla moglie**



Trattamento

1. **Lithium Sali** fino a 900 mg/die (litiemia 0,6)
2. **Acido Valproico** fino a 300 mg/die
3. **Olanzapina** up to 10 mg/die
4. **Aloperidolo** fino a 2,5 mg/die

Resistenza al trattamento,
persistenza di sintomi psicotici, EPS, sintomi depressivi e cognitivi

Quale antipsicotico useresti per questo paziente?

- Chlorpromazine
- Risperidone
- Clozapine
- Aripiprazole
- Lurasidone



Clicca qui per votare:

<https://pigeonhole.at/FARMACOTERAPIA/po/1389423>